

PRESENTACIONES
DISPONIBLES
Y CARACTERÍSTICAS

- > Mastic flexible de color « kaki », para utilizar en frío, para el tratamiento general de las vías aéreas de penetración.
 - > Contiene resinas de síntesis, aceites vegetales y terpenos de pino y abeto.
 - > Asegura una barrera mecánica destinada a la protección de las heridas del corte y a la cicatrización en el injerto.
 - > Mastic para injertar y cicatrizar.
- ENVASES DISPONIBLES:**
- > Frasco aplicador de 250g: embalaje de 12 unidades.
 - > Bote de 1 KG: embalaje de 12 unidades.

MODO DE EMPLEO

- > Utilización directa con pincel, sin preparación previa.
- > Se puede diluir en un 5 a 10 % de agua máximo para facilitar el tratamiento de las heridas de la poda antes del injerto.
- > Phytopast G debe aplicarse inmediatamente después del corte o del raspado de los chancros: la barrera física preventiva que se consigue en heridas frescas impedirá la penetración de numerosos hongos y la colonización de los tejidos vegetales profundos.

VENTAJAS

- > Muy fácil de aplicar: el mastic se usa en frío y es flexible.
- > Sin riesgo de quemaduras para el aplicador ni para los injertos, en comparación con el uso de ceras tradicionales.
- > Polivalencia de uso: cicatrización de las heridas, injertos y sobre-injertos.
- > Su composición única facilita la formación de un protector cicatrizante.
- > No gotea cuando se aplica en heridas verticales, incluso aplicado sobre una superficie húmeda.
- > Viscosidad constante a partir de 1°C.
- > Un porcentaje de recuperación de los injertos equivalente al menos, al de las ceras tradicionales.
- > Sin clasificación toxicológica.

LÍMITES
DE USO

- > Almacenar el mastic al abrigo de las heladas.
- > Aplicar en época no lluviosa: es necesario un período de 24 horas sin lluvia para una polimerización del mastic.

MERCADOS
INDICADOS

- > Arboricultura: en producciones de frutales de pepita y hueso.
- > Para viñas y plantas de tomate.
- > Jardineros aficionados y zonas verdes: para árboles frutales y ornamentales.

ADVERTENCIAS
DE USO

- > Precaución para tratar los chancros :
Raspar cuidadosamente la herida eliminando las partes muertas afectadas por la enfermedad. Cuando esté saneada, aplicar sobre la herida una capa de Phytopast G con pincel, sin preocuparse por rebosar sobre la corteza.

